



## AGALAX TRES

Vacuna inactivada frente a agalaxia contagiosa en suspensión inyectable



### COMPOSICIÓN POR DOSIS (2 ML)

*Mycoplasma agalactiae* cepa N84 .....  $\geq 1:20^*$  IC  
*Mycoplasma capricolum* cepa 27343 ..... cepa HM  $\geq 1:20^*$  IC  
*Mycoplasma mycoides* subespecie *mycoides* (LC) inactivado .....  $\geq 1:20^*$  IC  
IC\* Título de anticuerpos obtenido por la técnica de inhibición del crecimiento tras la administración de una dosis en corderos.

### INDICACIONES

**Ovino y caprino:** Inmunización activa frente a agalaxia contagiosa producida por *Mycoplasma agalactiae*, *Mycoplasma capricolum* o *Mycoplasma mycoides* subespecie *mycoides*.

**Inicio de inmunidad:** Un mes después de la administración de la segunda dosis.

**Duración de la inmunidad:** Cuatro meses después de la administración de la segunda dosis.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Subcutánea.

### POSOLOGÍA

2 ml/animal.

En rebaños sanos o indemnes, una aplicación en todo el efectivo de reproductores, machos y hembras y en todos los animales de reposición a partir de los 2-3 meses de vida.

En rebaños infectados o con grave riesgo de infección, administrar una segunda dosis a las 2-4 semanas de la primera.

En general se recomienda la revacunación cada 4-6 meses, dependiendo de la presión infectiva.

### TIEMPO DE ESPERA

Cero días.

### PRESENTACIÓN

Envases con 100 ml (50 dosis) y 250 ml (125 dosis).

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2568 ESP