



# AGALAX UNO

Vacuna inactivada frente a agalaxia contagiosa en suspensión inyectable



## COMPOSICIÓN POR DOSIS (2 ML)

*Mycoplasma agalactiae*, inactivado cepa N84.....  $\geq 1:20^*$

\* Título de anticuerpos obtenido por la técnica de inhibición el crecimiento tras la administración de una dosis en corderos.

## INDICACIONES

**Ovino y caprino:** Inmunización activa frente a agalaxia contagiosa producida por *Mycoplasma agalactiae*.

**Inicio de inmunidad:** Un mes después de la administración de la segunda dosis.

**Duración de la inmunidad:** Cuatro meses después de la administración de la segunda dosis.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Subcutánea.

## POSOLOGÍA

2 ml/animal.

En rebaños sanos o indemnes, una aplicación en todo el efectivo de reproductores, machos y hembras y en todos los animales de reposición a partir de los 2-3 meses de vida.

En rebaños infectados o con grave riesgo de infección, administrar una segunda dosis a las 2-4 semanas de la primera.

En general se recomienda la revacunación cada 4-6 meses, dependiendo de la presión infectiva.

## TIEMPO DE ESPERA

Cero días.

## PRESENTACIÓN

Envases con 100 ml (50 dosis) y 250 ml (125 dosis).

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2567 ESP