



# ANTRAVAX

Vacuna frente al carbunco bacteridiano en suspensión inyectable



## COMPOSICIÓN POR ML

*Bacillus anthracis* vivo atenuado, cepa Sterne 34F2.....  $\geq 0,5-1 \times 10^7$  esporos

## INDICACIONES

**Bovino y ovino:** Inmunización activa frente al carbunco bacteridiano producido por *Bacillus anthracis*.

La inmunidad se adquiere a las 3 semanas de la vacunación y se mantiene durante 1 año. Su uso no está recomendado en hembras con avanzado estado de gestación.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Subcutánea.

## POSOLOGÍA

**Bovino:** 2 ml/animal.

**Ovino:** 1 ml/animal.

Se recomienda vacunar a los animales a partir de los 3 meses de edad, revacunando anualmente excepto en las áreas endémicas, en las que se debería revacunar cada 6 meses.

Primovacunación: A partir de 3 meses.

Revacunación: Anualmente excepto en áreas endémicas en las que se debería revacunar cada 6 meses.

## TIEMPO DE ESPERA

Cero días.

## PRECAUCIONES ESPECÍFICAS EN PERSONAS QUE ADMINISTRAN EL MEDICAMENTO

La vacuna puede ser patógena para el ser humano.

## PRESENTACIÓN

Envase con 50 ml.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2857 ESP