



AQUAMICIN

Antibacteriano
en solución oral



COMPOSICIÓN POR ML

Neomicina (equivalente a 150 mg de neomicina sulfato)..... 100 mg

INDICACIONES

Terneros: Colibacilosis y salmonelosis.

Cerdos: Colibacilosis, salmonelosis, disentería vibriónica y enfermedad de los edemas.

Perros: Infecciones bacterianas del tracto gastrointestinal.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a bóvidos una vez iniciada la rumia.

No administrar a animales deshidratados con insuficiencia renal o depresión respiratoria.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, directamente o disuelto en el agua de bebida, leche o lacto-reemplazante. Preparar diariamente la solución de bebida.

POSOLOGÍA

Terneros: 1 ml/6-15 kg p.v. cada 6-12 horas.

Cerdos: 1 ml/6 kg p.v. cada 8-12 horas.

Perros: 1 ml/6-15 kg p.v. cada 6 horas.

Prolongar el tratamiento durante 3-5 días.

Estimar diariamente la cantidad total requerida del fármaco según el peso de los animales a tratar y añadir al agua de bebida, leche, lactoreemplazante o administrarlo directamente.

TIEMPO DE ESPERA

Terneros: 30 días.

Cerdos: 20 días.

PRECAUCIONES ESPECIALES

No administrar con bloqueantes neuromusculares, anestésicos generales, antidiuréticos y otros aminoglucósidos.

PRESENTACIÓN

Envases con 100 ml y 1 litro.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 326 ESP