



BENZATARD

Antibacteriano
en suspensión inyectable



COMPOSICIÓN POR ML

Bencilpenicilina benzatina	150.000 U.I.
Bencilpenicilina procaína.....	150.000 U.I.

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones bacterianas, causadas por microorganismos sensibles a la asociación, tales como:

Porcino: Procesos respiratorios asociados a *P. multocida*, *Streptococcus suis*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*. Mal rojo (*Erysipelothrix rhusiopathiae*). Infecciones asociadas a *Arcanobacterium pyogenes* y *Streptococcus suis*.

Equino: Afecciones cutáneas y podales asociadas a *Arcanobacterium pyogenes* y *Fusobacterium necrophorum*. Neumonía y bronconeumonía asociadas a *Staphylococcus* spp. y *Streptococcus* spp. Papera equina (*Streptococcus equi* subsp. equi.) Metritis asociada a *Actinomyces pyogenes*.

Perros y gatos: Amigdalitis, traqueobronquitis y neumonía asociadas a *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. y *Norcadia*.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular. No inyectar por vía intravenosa o en las proximidades de un nervio importante.

POSOLOGÍA

Porcino y equino: 1 ml/25 kg p.v., en dosis única.

Perros y gatos: 0,5 ml/5 kg p.v., en dosis única.

Puede repetirse la misma dosis a las 72 horas.

Respetar volumen máximo por punto de inyección de 10 ml para equino y 5 ml para porcino.

TIEMPO DE ESPERA

Carne:

Porcino: 78 días.

No administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano.

PRECAUCIONES ESPECIALES

No usar en animales en periodo de lactación.

No administrar conjuntamente con antibióticos bacteriostáticos, fenilbutazona, sulfamidas, salicilatos y otros ácidos débiles

PRESENTACIÓN

Envase con 100 ml.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 589 ESP