



# CORTEXONA RETARD

Antiinflamatorio esteroideo  
en suspensión inyectable



## COMPOSICIÓN POR ML

Dexametasona (isonicotinato)..... 1,25 mg

## INDICACIONES

**Bovino, equino, perros y gatos:** Inflamaciones originadas por infecciones, alergias, traumatismos y otras etiologías.

**Bovino:** Cetosis.

## CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales sometidos a tratamiento inmunológico.

Queda a decisión del veterinario instaurar una terapia de convergencia en los casos contraindicados para su uso.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular.

## POSOLOGÍA

**Terneros y equino:** 1 ml/15,5-62,5 kg p.v., en dosis única.

**Vacas:** 1 ml/62,5 kg p.v., en dosis única.

**Perros:** 0,50 ml/3-12,5 kg p.v., en dosis única.

**Gatos:** 0,25 ml/1-3 kg p.v., en dosis única.

Repetir la dosis, en caso necesario, después de transcurridos 10-14 días de la primera administración.

## TIEMPO DE ESPERA

Carne: 60 días.

Leche: 48 horas.

No administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano.

## PRECAUCIONES ESPECIALES

No administrar durante el último tercio de la gestación.

No administrar conjuntamente con antidiabéticos, barbitúricos, diuréticos deflectores de potasio, indometacina, salicilatos, antihistamínicos.

## PRESENTACIÓN

Envases con 10 y 50 ml.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 542 ESP