Ceftiosan® 50 mg/ml Suspensión Inyectable para porcino y bovino

Ceftiofur. Uso veterinario.

INDICACIONES

Infecciones asociadas con bacterias sensibles al ceftiofur:

Porcino: Tratamiento de la enfermedad respiratoria bacteriana asociada con *Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae y Streptococcus suis.* Este medicamento no debe utilizarse en cerdos con un peso mayor a 125 kg.

Bovino: Tratamiento de la enfermedad respiratoria bacteriana asociada con la *Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida y Haemophilus somnus*.
Tratamiento de la necrobacilosis interdigital aguda (panadIzo, inflamación de la pezuña) asociada con *Fusobacterium necrophorum y Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica).*
Tratamiento del componente bacteriano de la metritis aguda posparto (puerperal) en los 10 días siguientes al parto asociada con *Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes y Fusobacterium necrophorum,* sensibles al ceftiofur. La indicación se limita a los casos en que el tratamiento con otro antimicrobiano haya fracasado.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular en porcino.
Subcutánea en bovino.

ESPECIES DE DESTINO

POSOLOGÍA

Porcino:
Enfermedad respiratoria bacteriana: 3 mg ceftiofur /kg PV/día durante 3 días por vía intramuscular, es decir, 1 ml/16 kg PV en cada inyección.

Bovino:
Enfermedad respiratoria bacteriana: 1 mg ceftiofur /kg PV/día durante 3 a 5 días por inyección subcutánea, es decir, 1 ml/50 kg PV en cada inyección.
Necrobacilosis interdigital aguda: 1 mg/kg PV/día durante 3 días por inyección subcutánea, es decir, 1 ml/50 kg PV en cada inyección.
Metritis posparto aguda en los 10 días posteriores al parto: 1 mg/kg PV/día durante 5 días consecutivos por inyección subcutánea, es decir, 1 ml/50 kg PV en cada inyección.
En caso de metritis posparto aguda, en algunos casos puede ser necesaria terapia de apoyo adicional.
Cada inyección se debe aplicaren diferentes puntos, sin hacerlo sobre inyecciones anteriores.

Ceftiosan® 50 mg/ml Suspensión Inyectable para porcino y bovino

Ceftiofur. Uso veterinario.

PRESENTACIÓN

Caja con 36 x 100 ml.
Caja con 20 x 250 ml.

TIEMPO DE ESPERA

Porcino: Carne: 8 días.
Bovino: Carne: 8 días
Leche: cero horas.

COMPOSICIÓN POR ML

Ceftiofur hidrocloruro	50 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

PROPIEDADES

El ceftiofur es una cefalosporina de nueva generación que es activa contra muchas bacterias Gram positivas y Gram negativas. Ceftiofur inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana y por lo tanto, tiene propiedades bactericidas.

El ceftiofur es activo contra los siguientes microorganismos, que están implicados en las enfermedades respiratorias en porcino: *Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Streptococcus suis. Bordetella bronchiseptica* es intrínsecamente no susceptible al ceftiofur.

También es activo contra bacterias implicadas en la enfermedad respiratoria en bovino: *Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Haemophilus somnus;* bacterias implicadas en la inflamación aguda de la pezuña de bovino (necrobacilosis interdigital) en bovino: *Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus* (*Porphyromonas asaccharolytica*); y bacterias asociadas con la metritis aguda posparto (puerperal) en bovino: *Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes y Fusobacterium necrophorum.*

MODO DE CONSERVACIÓN

No refrigerar ni congelar. Proteger de la congelación.

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Reg nº 2320 ESP

CONTRAINDICACIONES

No inyectar por vía intravenosa.
No administrar a ningún animal que haya demostrado previamente ser hipersensible al ceftiofur, a otros antibióticos beta-lactámicos o a cualquiera de los excipientes.
No usar en aves de corral (ni en sus huevos) por riesgo de propagación de resistencias a antimicrobianos a los seres humanos.

REACCIONES ADVERSAS

Pueden producirse reacciones de hipersensibilidad no relacionadas con la dosis.
Ocasionalmente pueden producirse reacciones alérgicas (reacción cutánea, anafilaxia). Si se produce reacción al tratamiento, retirar el tratamiento.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN

Agite bien el recipiente antes de usarlo para devolver el producto a la suspensión.

INTERACCIONES

Las propiedades bactericidas de las cefalosporinas se alteran con el uso simultáneo de antibióticos bacteriostáticos (macrólidos, sulfonamidas y tetraciclinas).

PRESCRIPCIÓN

Se debe entregar sólo con prescripción veterinaria.