



# EPRIZERO® 5 MG/ML

Solución para unción dorsal  
continua para bovino de carne y leche



## COMPOSICIÓN POR ML

Eprinomectina..... 5 mg

## INDICACIONES

**Bovino** de carne y leche. Tratamiento y profilaxis de los siguientes parásitos: **Vermes redondos gastrointestinales** (adultos y larvas de cuarto estadio): *Ostertagia* spp., *Ostertagia lyrata* (adulto), *Ostertagia ostertagi* (incluyendo inhibidas *O. ostertagi*), *Cooperia* spp. (incluyendo inhibidas *Cooperia* spp.), *Cooperia oncophora*, *Cooperia pectinata*, *Cooperia punctata*, *Cooperia surnabada*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus* spp., *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Bunostomum phlebotomum*, *Nematodirus helvetianus*, *Oesophagostomum* spp. (adulto), *Oesophagostomum radiatum*, *Trichuris* spp. (adulto). **Vermes pulmonares** (adultos y larvas de cuarto estadio): *Dictyocaulus viviparus*. **Barros** (estadios parasitarios): *Hypoderma bovis*, *H. lineatum*. **Ácaros de la sarna**: *Chorioptes bovis*, *Sarcoptes scabiei var bovis*. **Piojos**: *Damalinea bovis* (piojo masticador), *Linognathus vituli* (piojo chupador), *Haematopinus eurysternus* (piojo chupador), *Solenopotes capillatus* (piojo chupador). **Moscas de los cuernos**: *Haematobia irritans*.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Tópica, únicamente por unción dorsal continua a lo largo de la línea dorsal, aplicando una tira estrecha y extendiendo desde la cruz hasta la base de la cola.

## POSOLOGÍA

1 ml/10 kg p.v.

La lluvia, antes o después del tratamiento, no afectará a la eficacia del medicamento veterinario.

## TIEMPO DE ESPERA

Carne: 10 días.

Leche: 0 horas.

## PRESENTACIÓN

Envases de 1 litro y mochilas colapsables de 2,5 y 5 litros.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2753 ESP