



FIEBRINA® PORCINO

Antipirético
en polvo oral



COMPOSICIÓN POR GRAMO

Ácido acetilsalicílico 700 mg

INDICACIONES

Porcino: antipirético.

CONTRAINDICACIONES

No emplear en animales con:

- Hipersensibilidad a los salicatos u otros AINES.
- Úlceras o hemorragias gastrointestinales.
- Problemas de coagulación sanguínea.
- Insuficiencia hepática o renal.
- Tratamiento con anticoagulantes.
- 2 semanas antes de una operación.
- Menos de un mes de edad.
- Cerdos en gestación.
- Severamente deshidratadas, hipovolémicos o hipotensos que requieran rehidratación parenteral.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, en el agua de bebida.

POSOLOGÍA

1,5 g de Fiebrina® Porcino/litro de agua de bebida hasta la remisión de la fiebre, durante un máximo de 5 días.

La solución deberá prepararse cada día.

Durante el tratamiento, el agua medicada deberá ser la única fuente de bebida.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 1 día.

PRECAUCIONES ESPECIALES

No asociarse con otros AINES o glucocorticoesteroides, ni con antibióticos aminoglicósidos.

PRESENTACIÓN

Envases con 1, 5 y 25 kg.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 1.629 ESP