



FLORFENIS® 300 MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE PARA BOVINO Y PORCINO



Antibacteriano en
solución inyectable

COMPOSICIÓN POR ML

Florfenicol..... 300 mg

INDICACIONES

Enfermedades causadas por bacterias sensibles al florfenicol.

Bovino: tratamiento de infecciones del tracto respiratorio en ganado vacuno debidas a *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* y *Histophilus somni*.

Porcino: tratamiento de brotes agudos de enfermedad respiratoria porcina causados por cepas de *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Pasteurella multocida*.

CONTRAINDICACIONES

No usar en verracos y toros adultos utilizados con fines reproductivos.

No usar en lechones de menos de 2 Kg. de peso.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: Intramuscular o subcutánea. **Porcino:** Intramuscular.

POSOLOGÍA

Bovino:

Vía intramuscular: 1 ml/15 kg p.v. dos veces con un intervalo de 48 horas.

Vía subcutánea: 2 ml/15 kg p.v. administrado una sola vez.

No administrar más de 10 ml por punto de inyección para ambas vías. La inyección debe realizarse únicamente en el cuello.

Porcino:

Vía intramuscular: 1 ml/20 kg p.v. en el músculo del cuello, dos veces con un intervalo de 48 horas. El volumen administrado por punto de inyección no debe exceder 3 ml.

TIEMPO DE ESPERA

Carne:

Bovino: por vía intramuscular, 30 días; por vía subcutánea, 44 días.

Porcino: 18 días.

Leche: No usar.

PRESENTACIÓN

Envases con 100 y 250 ml.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2.542 ESP