



FLUMESYVA® 200 MG/ML

Antibacteriano concentrado
para solución oral



COMPOSICIÓN POR ML

Flumequina. 200 mg

INDICACIONES

Terneros: Bronconeumonía, enteritis colibacilares, enfermedades neonatales y salmonelosis.

Cerdos: Colibacilosis, enteritis, gastroenteritis y enfermedades neonatales.

Corderos: Colibacilosis, pasteurelisis y septicemia.

Pollos y pavos: Colibacilosis, salmonelosis y pasteurelisis.

CONTRAINDICACIONES

No usar en animales con insuficiencia renal o hepática, ni con rumen funcional.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, en el agua de bebida.

POSOLOGÍA

Terneros: 0,25-0,50 ml/10 kg p.v., cada 12 horas, durante 5 días.

Cerdos adultos: 0,30 ml/10 kg p.v., cada 12 horas, durante 3-5 días.

Lechones: 0,60 ml/10 kg p.v., cada 12 horas, durante 3-5 días.

Corderos: 0,30 ml/10 kg p.v., cada 12 horas, durante 4-6 días.

Pollos y pavos: 1 ml/8-16 kg p.v./día, durante 3-5 días.

TIEMPO DE ESPERA

Carne:

Porcino y pollos: 2 días.

Pavos, terneros y corderos: 10 días.

Leche: No usar.

Huevos: No usar. No usar en las 4 semanas anteriores y posteriores al inicio de la puesta.

PRECAUCIONES ESPECIALES

No exponer al sol a los animales tratados por peligro de fotosensibilización. No administrar simultáneamente con trimetoprima.

PRESENTACIÓN

Envase con 1 litro.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 571 ESP