



# FORTICLINA® RETARD

Antibacteriano  
en solución inyectable



## COMPOSICIÓN POR ML

Oxitetraciclina (dihidrato) ..... 200 mg

## INDICACIONES

Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la oxitetraciclina:

**Bovino:** Infecciones respiratorias, genitales, podales, actinobacilosis, difteria del ternero, mastitis y anaplasmosis bovina.

**Porcino:** Infecciones respiratorias, genitourinarias, Mal Rojo y onfalobitis.

**Ovino y caprino:** Infecciones respiratorias, genitales, podales, mastitis, aborto enzoótico, onfalobitis y poliartritis.

## CONTRAINDICACIONES

No usar en animales con alteraciones hepáticas o renales.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda.

## POSOLOGÍA

1 ml/10 kg p.v., en dosis única.

Respetar volumen máximo por punto de inyección de:

**Bovino:** 15 ml.

**Porcino:** 10 ml.

**Ovino y caprino:** 5 ml.

## TIEMPO DE ESPERA

Carne:

**Bovino:** 30 días

**Porcino:** 23 días

**Ovino y caprino:** 24 días.

Leche: No usar.

## PRESENTACIÓN

Envases con 100 y 250 ml.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2657 ESP