GENTAYET

Antibacteriano en solución inyectable

COMPOSICIÓN POR ML

Gentamicina (sulfato).....40 mg

INDICACIONES

Bovino: Mastitis coliforme, colibacilosis y salmonelosis en terneros, infecciones genitourinarias e infecciones del tracto respiratorio.

Lechones: Colibacilosis neonatal.

Equino: Colibacilosis y salmonelosis en potros, infecciones genito-urinarias e infecciones del tracto respiratorio.

Perros: Infecciones genito-urinarias, infecciones del tracto respiratorio, infecciones de la piel y de tejidos blandos, gastroenteritis bacterianas, bacteriemias y septicemias.

Gatos: Infecciones genito-urinarias, infecciones del tracto respiratorio, infecciones de piel y de tejidos blandos, gastroenteritis bacterianas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular o intravenosa lenta.

POSOLOGÍA

Bovino: 1 ml/16 kg p.v./8-12 horas, durante 3 días.
Lechones: 0,125 ml/animal, en dosis única.
Equino: 1 ml/10-20 kg p.v./8 horas, durante 3 días.
Perros y gatos: 1 ml/8 kg p.v./12 horas, durante 3-4 días.

TIEMPO DE ESPERA

Carne:
Porcino: 40 días.
Bovino: 60 días.
No administrar a équidos cuya carne se destine a consumo humano.
Leche: 3 días.

PRECAUCIONES ESPECIALES

No administrar, en ningún caso, más de 7 días.
Contraindicado su uso en hembras gestantes.

PRESENTACIÓN

Envases con 100 y 250 ml.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 347 ESP