



# MARBOSYVA® 100 MG/ML

Solución inyectable  
para bovino y porcino (cerdas)



## COMPOSICIÓN POR ML

Marbofloxacino..... 100 mg

## INDICACIONES

**Bovino:** Tratamiento de mastitis aguda causada por cepas de *Escherichia coli* sensibles a marbofloxacino, durante el período de lactancia. Tratamiento de infecciones respiratorias causadas por cepas sensibles de *Histophilus somni*, *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma bovis*.

**Porcino (cerdas):** Tratamiento del Síndrome de Disgalaxia Postparto, SDP (Síndrome Metritis Mastitis Agalaxia) causado por cepas bacterianas sensibles a marbofloxacino.

## POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

### Bovino:

Mastitis aguda: 1 ml/50 Kg p.v./día durante 3 días consecutivos, por vía intramuscular o subcutánea. La primera inyección puede administrarse por vía intravenosa.

Infecciones respiratorias: 2 ml/25 Kg p.v. inyección única por vía intramuscular. Si el volumen de la inyección es mayor de 20 ml, se debe dividir en dos o más puntos la inyección.

En casos de infecciones respiratorias causadas por *Mycoplasma bovis*: 1 ml/50 Kg p.v./día durante 3 ó 5 días consecutivos, por vía intramuscular o subcutánea. La primera inyección puede administrarse por vía intravenosa.

**Porcino (cerdas):** 1 ml/50 Kg p.v./día durante 3 días consecutivos por vía intramuscular.

## TIEMPO DE ESPERA

### Bovino:

Inyección única: Carne: 3 días; Leche: 72 horas.

Inyección diaria: Carne: 6 días; Leche: 36 h.

**Porcino:** 4 días

## PRESENTACIÓN

Envases con 100 y 250 ml.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2670 ESP