



NEOVAC

Vacuna inactivada frente al mal rojo porcino en suspensión inyectable



COMPOSICIÓN POR DOSIS (2 ML)

Erysipelothrix rhusiopathiae serotipos 1 y 2 > 1 PR*

* Potencia relativa respecto a la vacuna de referencia.

INDICACIONES

Porcino: Inmunización activa contra el mal rojo.

Inicio de la inmunidad: 2 semanas después de la administración de la segunda dosis.

Duración de la inmunidad: 6 meses después de la administración de la primera dosis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda en el cuello.

POSOLOGÍA

2 ml/animal.

Primovacunación: Una dosis a las 12 semanas de edad y una segunda dosis 3-4 semanas más tarde.

Revacunación: Una dosis de recuerdo cada 6 meses. Cuando la presión de infección es elevada (especialmente en cerdo ibérico) administrar cada 3 meses.

Revacunación de cerdas adultas: Una dosis 2 semanas después de cada parto. La protección de los lechones puede asegurarse, si es necesario, administrando una nueva dosis un mes antes del parto, en hembras vacunadas anteriormente.

TIEMPO DE ESPERA

Cero días.

PRESENTACIÓN

Envase con 50 ml (25 dosis) y 100 ml (50 dosis).

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2.580 ESP