



PIPERACINA SYVA POLVO

Antihelmíntico
en polvo oral



COMPOSICIÓN POR GRAMO

Citrato de piperacina 1.000 mg

INDICACIONES

Tratamiento de las nematodosis intestinales producidas por las formas adultas de los siguientes parásitos:

Porcino: *Oesophagostomum spp*, *Ascaris suum*.

Equino: *parascaris equorum*, *Oxyrus equi*, *Trichonema spp*.

Pollos: *Ascaridia Galli*, *Cappillaria spp*.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con alteraciones de tipo hepático, renal o con historial de ataques generalizados tónico-clónicos.

No administrar a animales debilitados o caquéticos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, en el agua de bebida o pienso.

POSOLOGÍA

Porcino y Equino: 3,1 g/10 kg p.v., en dosis única.

Aves (pollos): 0,90 g/10 kg p.v., durante 2 días consecutivos.

Repetir a las 4 semanas.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 2 días.

No administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano.

PRECAUCIONES ESPECIALES

No administrar simultáneamente con fenotiacinas ni purgantes.

PRESENTACIÓN

Envases con 1 y 5 kg.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 951 ESP