



QUINOXALINA SYVA COMPRIMIDOS



Anticoccidiósico
en comprimidos

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO

Sulfaquinoxalina (sódica)..... 250 mg

INDICACIONES

Tratamiento y prevención de la coccidiosis cecal y duodenal producidas por:

Pollos: *Eimeria tenella*, *Eimeria necatrix*, *Eimeria acervulina*, *Eimeria maxima*, *Eimeria mivati*.

Pavos: *Eimeria adenoeides*, *Eimeria meleagridis* y *Eimeria gallopavonis*.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con procesos hemorrágicos o alteraciones hepáticas o renales.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, en el agua de bebida o pienso.

POSOLOGÍA

Prevención:

1 comprimido por cada 2 litros de agua ó 2 kg de pienso, durante las 8 primeras semanas de vida.

Tratamiento:

Pollos: 8 comprimidos por cada 5 litros de agua ó 5 kg de pienso durante 2-3 días. Descansar 2 días y administrar 2 días más a razón de 1 comprimido por litro de agua ó kg de pienso.

Pavos: 1 comprimido por litro de agua o kg de pienso.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 21 días.

Huevos: No usar.

PRESENTACIÓN

Envase con 1.000 comprimidos.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 133 ESP