



RHINANVAC® CERDOS

Vacuna inactivada frente al complejo respiratorio porcino en suspensión inyectable



COMPOSICIÓN POR DOSIS (2 ML)

<i>Bordetella bronchiseptica</i>	≥ 0,9 log ₁₀ título TA*
<i>Haemophilus parasuis</i>	≥ 0,9 log ₁₀ título ELISA**
<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>	≥ 0,9 log ₁₀ título ELISA**
<i>Mannheimia haemolytica</i>	≥ 0,9 log ₁₀ título ELISA**
<i>Pasteurella multocida</i> tipo D	≥ 0,9 log ₁₀ título ELISA**
Dermonecrotoxina de <i>P. multocida</i> tipo D	≥ 1 log ₁₀ título ELISA**

* Título medio de aglutinación obtenido tras la administración repetida de una dosis en cerdos.

** Título medio de ELISA obtenido tras la administración repetida de una dosis en cerdos.

INDICACIONES

Porcino: Inmunización activa frente a la rinitis atrófica porcina y procesos respiratorios producidos por *B. bronchiseptica*, *H. parasuis*, *M. hyopneumoniae*, *Mannheimia haemolytica* y *P. multocida* tipo D.

Inicio de la inmunidad: 4 semanas después de la administración de la segunda dosis.

Duración de la inmunidad: 6 meses.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular.

POSOLOGÍA

2 ml/animal.

Primovacunación: Aplicar una dosis a las 12 semanas de edad.

Revacunación: Aplicar una segunda dosis 3 ó 4 semanas después.

Cerdas y verracos no vacunados: 1 dosis a todos los animales y revacunar a las 4-6 semanas.

Verracos: Revacunar cada 6 meses.

Cerdas: Revacunar en cada gestación entre las 4 y las 2 semanas antes del parto.

TIEMPO DE ESPERA

Cero días.

PRESENTACIÓN

Envase con 100 ml (50 dosis).

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2879 ESP