



SINVERMIN® OVINO

Antihelmíntico
en suspensión oral



COMPOSICIÓN POR ML

Albendazol..... 28,50 mg

INDICACIONES

Tratamiento de nematodosis gastrointestinales y pulmonares producidas por nematodos sensibles al albendazol, tanto formas adultas, como larvas y huevos. Tratamiento de teniasis producida por *Moniezia spp.* Tratamiento de distomatosis.

No está recomendado para el tratamiento de fasciolosis aguda causada por formas inmaduras.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, mediante pistola dosificadora.

POSOLOGÍA

Administrar una única dosis.

Tratamiento nematodosis y teniasis: 1 ml/6-7,50 kg p.v.

Tratamiento fasciolosis: 1 ml/4-6 kg p.v.

Tratamiento dicrocelosis: 1 ml/2-3 kg p.v.

OBSERVACIONES

En animales de reciente introducción deberá de ser administrada una dosis a su llegada a la explotación y mantenerlos al menos 8 horas sin salir a los pastos.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 10 días.

Leche: 4 días.

PRECAUCIONES ESPECIALES

Evitar tratar ovejas con dicrocelosis en época de apareamiento y durante los 3 primeros meses de gestación. En los demás casos, deben atenerse muy bien a la posología durante el primer mes de gestación.

PRESENTACIÓN

Envases con 1 y 4,5 litros.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 1.051 ESP