



SYVAMOX® POLVO ORAL

Antibacteriano
en polvo oral



COMPOSICIÓN POR GRAMO

Amoxicilina (trihidrato) 700 mg

INDICACIONES

Porcino (cerdos de cebo): Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas de *Pasteurella multocida* sensibles a la amoxicilina.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, en el agua de bebida.

POSOLOGÍA

143 mg /10 kg p.v./12 horas durante 5 días.

En general administrar disueltos en el agua de bebida: 286 g de SyvamoX® Polvo Oral/1.000 litros/día o una cucharilla de medida /100 litros, repartido en 2 tomas diarias, durante 5 días.

El agua medicada debe renovarse 2 veces al día y desechar la que no se haya consumido. Durante el tratamiento, el agua medicada será la única fuente de bebida.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 14 días.

PRECAUCIONES ESPECIALES

No usar simultáneamente con neomicina ni antibióticos que inhiban la síntesis proteica bacteriana.

PRESENTACIÓN

Envases con 250 g y 1 kg.

Incluye dosificador.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 1.649 ESP